



1929年 宇宙膨張の発見








プリズムで見る ドップラー効果


「銀河はどんどん遠ざかっている!!」




















筑波と言えば、KEK

ここにもすごい加速器があります。 一周3kmとLHCより1/10 小さいけど LHCの10倍も衝突頻度があって、すっごい数の反応を観測できる




3世代目のクォークを 調べて、


粒子と 反粒子(時間を遡る) の小さな違いの研究

何故 今の宇宙には 物質しかないのか?

3世代目は日本が深く関係









「止まった光??」 光は止まれない。 どんな人が、どうみても 秒速30万kmで 動いてる。 (相対性理論)

この違いは何故?





「原子や電子」もとめることが出来ます。





「質量」 があると運動が阻害されて 速度も遅くなるし、止まれる。


重さは重力の強さなんですが、 「質量」と一致している。


しかし、素粒子の原理からは


素粒子の原理 その1 全ての力はゲージ原理 宇宙全体で位相の取り方が同じというのは、相対論を考えると変時空の各点で任意にとって良い(局所的対称性:ゲージ原理)位相差は観測出来るので物理法則は無茶苦茶になる。この歪みを直す様に、粒子が伝搬する "位相の帳尻あわせ"粒子(これがゲージ粒子で力の源) (国量(m)があるとexp(-m*d) で弱くなる(マイスナー効果)













真空につまっているのはヒッグス粒子でなく **ヒッグス場**

ヒッグス粒子にコツコツ ぶつかりながら、進んでいく というのは、間違いで



ヒッグス場に満たされた中を 運動すると、たえず 反応繰り返してまっすぐ進まない



→ これが質量がもった様にみえる。


ヒッグス場に満たされた状態(粒ではない)

粘性がある液体の中で、どっっと動けないと言うのではなくて、 もっと凄いことを真空はしてくれてます

ヒッグス場は、弱い力の電荷バッファー





左巻きは「弱い相互作用」感じる vs 右巻きは感じない L とRは元々別の粒子





コツコツとぶつかる度に 弱い相互作用の電荷をもらったり あげたり進んでいく


真空はニュートリノの様な性質(電荷)をもった、 変な状態 にみちている!!
















ヒッグス粒子発見の意義(1) 「17番目の素粒子がみつかった」という チョロい話ではない

物質を形作る素粒子 クォーク・レプトン


力を伝える素粒子 ゲージ粒子


質量を生み出す 真空:ヒッグス場


容れ物なので 宇宙全体にひろがっている

「真空」の意味

<u>真空が「真の空」でなく、何か詰まった</u>不思議な状態 (何か? ニュートリノの電荷(弱い力)をもった のっぺりしたもの:宇宙全体に一様に、方向もなく) そのエネルギーが宇宙を生み、進化させていった。 宇宙の誕生に密接に関係







ヒッグス粒子発見の意義(2)

物質を形作る素粒子 クォーク・レプトン カイラル原理 質量を生み出す 容れ物なの

容れ物なので 宇宙全体にひろがっている

126GeV ヒッグス粒子は軽すぎる!!!!

それぞれの質量には、質量をゼロにする原理がある

- 1) カイラル原理
- 2) ゲージ原理 だから多少、環境がわるくても、軽いまま

ヒッグスは、全く新しいカテゴリーの粒子新しい原理が必要

何故重くなる??? 量子力学「嘘ついていい」



 $\hbar = 1.05 \times 10^{-34} J \cdot s$

 $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar$ $\Delta t \cdot \Delta E \ge \hbar$


大きく ΔE がずれる(嘘つく)と短い間 小きく ΔE 嘘つくと比較的長い間

電子·陽電子


光

電子·陽電子

こういう、嘘の(量子力学の)効果: 少しだけど、ちゃんと見える。痕跡を残している




量子力学の効果で重くなる!!



新しい原理でが 必要

量子力学的状態(嘘の効果)トップクォークペアーになっている。 その痕跡で、ヒッグス粒子は、無茶苦茶重くなるはず。 でも 126GeVと軽い。何故???




ぐるっと1周したとき、効果の符号が逆になる必要 スピンの性質


相殺?? 「超対称性」!!

素粒子のスピン

スピン:角運動量と同じ性質



素粒子はスピンを もっている。 スピンはよく「自転」に 例えられる。 本当は、大きさのないもので自転はない。



 $\tau = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$


粒子の持っている"固有の性質":(起源不明) スピン ½ $(h/2\pi)$ と $h/2\pi$


素粒子の回転に関係している (角運動量=回転)


ボーズ粒子 360度でもとの状態に戻る。(我々の感性) フェルミ粒子 360度回しても符号が逆:


720度回してはじめてもとの状態に戻る。

→ フェルミ粒子から見ると720度対称のような世界









2015 LHCはエネルギーを増強して超対称性を探る




昨年の12月17日で 4+4 TeVの 実験は終了

2015年再開 14TeVに エネルギーを 増強

曲げるための磁石:いまは6000アンペアの電流 陽子4TeVまでしか曲げられない。 増強して 1万アンペア → 7TeVまで曲げられる。

ヒッグス発見が新しい時代の幕開け •超対称性 Particle Physics 時空 マクロな重力と 従来"素粒子"研究 ミクロな素粒子の融合 •余剰次元 宇宙の誕生 と進化 暗黒エネル 素粒子 時空、真空、素粒子 一体化した研究 ・ヒッグス粒子(質量の起源) 真空 ・自発的に対称性の破れ →多様な宇宙


おまけ





LHCの加速装置はショボイ


一周して加速したエネルギーは16 MeV です。かなり小さいです。ただ、毎秒1万回転ぐらいしますので、毎秒0.1TeV加速できます。

こんな加速器がわずか 8個設置されているだけ。









LHC建設には高い技術が不可欠 日本企業も大きく貢献。 LHCプロジェクトマネージャー「日本の技術無くしてはLHCは出来なかった」





【IHI】1.8Kヘリウム冷凍システム

【カネカ】絶縁テープ









【東芝】ビーム収束用四極超


温完全非磁性ステンレス(8の 字状のカラ一部分) 【JFEスチール】超伝導電磁石





【古河電工】超伝導ケーブル






































と言うわけで、今年3月14日に「発見したアレはやっぱりヒッグス粒子でした」と発表

8:31

CERN Press Balaasa: New results indicate that naticial discovered at CERN is a Higgs boson

La version française sera disponible ultérieurement ici: http://press.web.cern.ch/fr/press-releases

New results indicate that particle discovered at CERN is a Higgs boson

Geneva, 14 March 2013. At the Moriond Conference today, the ATLAS and CMS collaborations at CERN's Large Hadron Collider (LHC) presented preliminary new results that further elucidate the particle discovered last year. Having analysed two and a half times more data than was available for the discovery announcement in July, they find that the new particle is looking more and more like a Higgs boson, the particle linked to the mechanism that gives mass to elementary particles. It remains an open question, however, whether this is the Higgs boson of the Standard Model of particle physics, or possibly the lightest of several bosons predicted in some theories that go beyond the Standard Model. Finding the answer to this question will take time.

Whether or not it is a Higgs boson is demonstrated by how it interacts with other particles, and its quantum properties. For example, a Higgs boson is postulated to have no spin, and in the Standard Model its parity – a measure of how its mirror image behave – should be positive. CMS and ATLAS have compared a number of options for the spin-parity of this particle, and these all prefer no spin and positive parity. This, coupled with the measured interactions of the new particle with other particles, strongly indicates that it is a Higgs boson.


"The preliminary results with the full 2012 data set are magnificent and to me it is clear that we are dealing with a Higgs boson though we still have a long way to go to know what kind of Higgs boson it is." said CMS spokesperson Joe Incandela.


"The beautiful new results represent a huge effort by many dedicated people. They point to the new particle having the spin-parity of a Higgs boson as in the Standard Model. We are now well started on the measurement programme in the Higgs sector," said ATLAS spokesperson Dave Charlton.

To determine if this is the Standard Model Higgs boson, the collaborations have, for example, to measure precisely the rate at which the boson decays into other particles and compare the results to the predictions. The detection of the boson is a very rare event - it takes around 1 trillion (10^{12}) proton-proton collisions for each observed event. To characterize all of the decay modes will require much more data from the LHC.


論より証拠

トップ・クォークの予言をしていた。 重くて直接見えていなくても





このような効果を 及ぼす




弱い力を伝えるZ粒子の性質 (質量・結合)を高い精度で調 べることで、

トップクォークの痕跡をしらべ その質量を正確に予言 (発見前に)

1994年に発見


68



4つの力のうち、重力が弱すぎる。 他の力と比較して10-40



相手が地球だから感じる 地球の重さ6 * 10²⁴ kg



でもケチな磁石にもまけてしまう。

その解として有力な「余剰次元とブレイン理論」


膜に張り付いた人生 (空間は9次元(ヒモ理論)

Extra Dimension
(余次元)我々はその中の3次元の膜に
張り付いている)通常の粒子重カ子(スピン2は
ひもで見ると輪)

3次元空間(ブレイン) 通常の空間


重力子は、広い空間を自由に行き来して、我々は3次元の膜にはりついている。 重力子がこの膜に来たときだけ感じる 一> 重力が 弱くみえる。

余剰次元は コンパクトに縮まっていて みえない。




余剰次元が6次元の場合はふしぎな形

これの大きさが不明 10⁻³⁵m くらいかもしれないし 10⁻¹⁹m と大きいかもしれない



10⁻³⁵mだと ヒッグス粒子が不安定 10⁻¹⁹m程度だと 安定 もし、大きさが10-19m だとLHCで効果が見える。 この距離まで近づくと、次元数が大きくなり 重力が強い力となる。



陽子の中のクォークが反対側の陽子のクォークとぶつかる距離が ブラックホールの地平線の大きさ (Rsシュバルツシルド半径)小さいと

 $d < R_s$ 吸い込まれてブラックホールになる。

